



# MANTEISION YMGORFFORI STOC MEWN TIR ÂR CYLCHDRO

---

Mae system ffermio gymysg, yn seiliedig ar dda byw a chnydio, yn rhan sylfaenol o ffermio organig, amaeth-acoledig ac adfywiol.

## **Pam ymgorffori da byw?**

Un o'r prif ffyrdd o wella iechyd y pridd yw integreiddio anifeiliaid; bydd planhigyn sydd wedi cael ei bori yn ffotosyntheseiddio mwy ac yn pwmpio mwy o garbon hylifol i'r pridd o'i gymharu â phlanhigyn sydd heb ei bori.

## **Mae manteision eraill yn cynnwys...**

- › Gwelliannau yn iechyd, strwythur a ffrwythlondeb y pridd
- › Gwell sefydlogrwydd pridd, gwrthsefyll sychder, ymdreiddiad dŵr a chynhwysedd dal dŵr
- › Gwelliant o ran rheoli chwyn – yn enwedig Cynffonweltl du
- › Cynnydd mewn cynhyrchiant – cynyddu refeniw
- › Cyfle i arallgyfeirio – risgiau o ledaenu cynhyrchiant
- › Lleihau'r defnydd o gemegau – lleihau costau mewnbwn
- › Lleihad mewn erydiad a chywasgiad pridd
- › Cynnydd mewn bioamrywiaeth
- › Cynnydd mewn deunydd organig pridd (SOM) – gall defaid hybu cynnydd o 35% mewn SOM
- › Cylch maetholion

## **Beth yw'r manteision i fenter da byw?**

- › Pori glân, heb barasitiaid ar gyfer y da byw
- › Mae meillion sy'n gosod nitrogen ac adeiladu ffrwythlondeb yn cynnig maeth da a chyfraddau twf cyflym
- › Mae gan wyndwn sy'n ymgorffori llawer o rywogaethau ac sy'n cynnwys planhigion fel ysgellog bridodweddau cynhyrchion lladd llyngyr, gan leihau costau milfeddygon
- › Gall gaeafu anifeiliaid allan leihau'r angen am siediau, gan leihau costau'n sylweddol
- › Gellir rhoi premiwm os caiff da byw eu pesgi ar laswellt yn unig

## **O ble mae'r da byw yn dod? A yw'r da byw eisoes ar y fferm neu a fyddant yn dod i mewn?**

Mae'r gofynion pori ar gyfer diadell o ddefaid bridio neu fuches sugno yn wahanol iawn i'r hyn sydd ei angen ar gyfer pesgi ŵyn neu bîff. Mae'r penderfyniad yn pennu'r strategaeth a'r model ffermio/busnes.

## **Opsiynau ar gyfer cydweithio rhwng ffermwyr tir â'r ffermwyr da byw**

- › Porfa aeaf i ddefaid dros y gaeaf (e.e. hau glaswellt o dan gnwd india corn)
- › Cynnal da byw eraill sy'n gaeafu allan (buchod sych, heffrod magu, gwartheg bîff ac ati)
- › Bargeinion gwellt am dail
- › Cytundeb/trwydded pori neu dorri
- › Cytundeb tenantiaeth busnes fferm
- › Prynu/bargen ar gyfer tail dofednod neu foch
- › Mentrau ar y cyd
- › Cynhyrchu moch yn yr awyr agored

## Dulliau cyffredin...

CYFLE	MANTEISION	PETHAU I'W HYSTYRIED
<p><b>Glaswellt, meillion a gwyndwn llysieuol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pori'r cnydau gan ddefnyddio da byw sy'n eiddo i'r ffermwr</li> <li>• Contract magu</li> <li>• Rhentu tir pori am dymor neu oes gwyndwn</li> <li>• Defaid ar borfa aeaf dros y gaeaf</li> <li>• Gwerthu fel cnwd sy'n sefyll neu fel silwair/gwair</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rheoli chwyn e.e Cynffonwellt du</li> <li>• Torri cylchoedd afiechyd</li> <li>• Gwella strwythur y pridd</li> <li>• Ychwanegu deunydd organig</li> <li>• Mae da byw yn ychwanegu maetholion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gellir ei ddefnyddio mewn cylchdro o un i dair blynedd neu fwy</li> <li>• Mae amseriad y sefydliad yn hyblyg (mis Ebrill - mis Medi)</li> <li>• Gall cystadleuaeth chwyn fod yn broblem yn hwyr yn y tymor</li> <li>• Dylid samplu pridd chwe mis cyn sefydlu glaswellt (deufis ar ôl taenu tail, gwrtaithe neu galch diwethaf)</li> <li>• Mae'n bwysig dewis y math/cymysgedd cywir gan y bydd hyn yn effeithio ar gost hadau a hirhoedledd</li> <li>• Mae rhai mathau'n perfformio'n well o dan y drefn silwair nag o dan y drefn pori (ac i'r gwrthwyneb)</li> </ul>
<p><b>Gorchuddio cnydau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cnydau gaeaf fel porthiant i wartheg a defaid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diogelu pridd rhag erydiad</li> <li>• Mae gwreiddiau'n darparu angorfa a ffynhonnell porthiant ar gyfer bioleg y pridd</li> <li>• Ailgylchu maetholion gan leihau perygl o lygredd</li> <li>• Mae deunydd planhigion yn gwella deunydd organig y pridd</li> <li>• Gwell ymdreiddiad dŵr pridd</li> <li>• Llai o ddŵr ffo o bridd a maetholion i gyrsiau dŵr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mae cnydau tymor byr, fel arfer yn cael eu tyfu a'u bwyta mewn llai na blwyddyn</li> <li>• Tyfir cnydau gorchudd rhwng y cynhaeaf a sefydlu'r prif gnwd</li> <li>• Glaswellt a grawn (e.e ceirch, rhyg a rhygwellt) yn addas ar gyfer pori ac yn darparu gorchudd tir cynnar da</li> <li>• Gellir pori brassica a heuwyd yn yr hydref (e.e radis, maip a mwstard) yn ofalus wrth ddarparu gwreiddiau dwfn.</li> <li>• Mae codlysiau addas ar gyfer gosod nitrogen yn cynnwys codog, ffacbys a meillion</li> <li>• Mae rhywogaethau cnwd gorchudd eraill yn cynnwys ysgellog, llyriaid a gwenith yr hydd</li> <li>• Gall pori ryddhau mwy o faetholion ar gyfer y cnwd canlynol o gymharu â dinistr mecanyddol neu gemegol</li> </ul>

### Ffactorau pwysig i'w hystyried

- Isadeiledd – cyfleusterau dŵr a bwydo, ffensys, systemau trin, siediau (os oes angen)
- Dylid ceisio cyngor cyfreithiol i greu cytundeb os ydych yn gweithio gyda ffermwyr eraill
- Peryglon clefyd e.e twberculosis mewn gwartheg (TB)
- Dylai da byw gael eu rheoli gan stocmyn hyfforddedig/profiadol
- Dylid cwblhau trwyddedau symud
- Trawsgydymffurfio
- Gwirio addaswydd tir ar gyfer da byw



Ariennir gan  
**Lywodraeth Cymru**  
Funded by  
**Welsh Government**

[www.llyw.cymru/cyswlltffermio](http://www.llyw.cymru/cyswlltffermio)

