

RHEOLI GWASARN DOFEDNOD

er mwyn sicrhau lechyd a Pherfformiad Adar

- Mae haid o ddofednod a gedwir ar wasarn wedi'i gadw'n dda yn **iachach** ac yn **fwy proffidiol**
- Mae gwasarn o ansawdd isel yn achosi **pododermatitis, llosg ar y garrau, a phothelli ar y frest**; “**syndrom coesau sigledig**” mewn tyrcwn – rhesymau dros israddio carcasau
- Galw cynyddol am draed ieir o Tsieina – mae premiwm ar gael ar gyfer traed heb eu marcio
- Gofyniad cyfreithiol i gadw gwasarn mewn cyflwr da



Gwasarn sych = adar iachach

CYFLYRAU SY’N GYSYLLTIEDIG Â GWASARN O ANSAWDD ISEL



LLOSG AR Y GARRAU



PODODERMATITIS



POTHELLI AR Y FREST

FFACTORAU SY’N EFFEITHIO AR GYFLWR GWASARN

1. Lleithder y gwasarn	2. Gwasarn seimllyd	3. Nitrogen yn y gwasarn
Yn allweddol mewn achosion o losg ar y garrau, pododermatitis a phothelli ar y frest	Mae gormodedd o fraster mewn bwyd yn cynyddu'r braster yn y carthion	Mae'r pothelli/llosggiadau gwaethaf yn digwydd pan fo N yn uwch na 5.5%
Yn cael ei effeithio gan ddyluniad cafnau dŵr, y tywydd, gwres ac awyriad, deunydd a dyfnder gwasarn, dwysedd stocio, diet ac iechyd adar	Mae braster uchel yn achosi i'r gwasarn gollu breuder Archwilio'r diet am fraster	Archwilio'r diet am gyfanswm ac ansawdd y protein



Lefel N uchel mewn gwasarn = colli plu ar y frest

Awyriad ac amgylchedd y sied

- › Rhyng-gysylltu rheolyddion **tymheredd yr amgylchedd, awyriad a lleithder**
- › Mae **nifer, oed yr adar a lleithder perthynol yr aer** sy'n cael ei dynnu i'r system awyru yn effeithio ar leithder
- › Lleithder targed o **50 – 70%**
- › Cyfradd awyru i gynnal lefelau amonia **< 25 rhan fesul miliwn**
- › Inswleiddio toeau a waliau i atal cyddwysiad

Bwyd/Diet

- › Mae ffactorau dietegol sy'n cynyddu cymeriant dŵr yn arwain at wasarn gwlypach
- › Ni ddylai lefelau **Sodiwm clorid, sodiwm bicarbonad, protein crai ac asidau amino** fynd uwchben y gofyniad
- › Mae gormodedd o **proteïn crai ac asidau amino** yn cynyddu gollyngiad N ac felly'n gwaethygu llosgiadau

Sut i reoli cyflwr y gwasarn



Dwysedd stocio

- › Uchafswm – **34 kg/m²** ar gyfer brwyliaid, dim mwy na **7 aderyn /m²** ar gyfer dofednod dodwy
- › Influences rate of evaporation of moisture

Deunydd a dyfnder y gwasarn

- › Mae **naddion pren** yn amsugno mwy na **gwellt**
- › Defnydd o ychwanegiadau ar y gwasarn - **asidau, bio-olsg, calsiwm ocsid (quicklime), calch wedi'i hydradu**
- › Mae gwasarn brau yn cynnwys bacteria sy'n dadelfennu ysgarthion ac yn rhyddhau gwres **gan gadw'r gwasarn yn gynnes**

Cafnau yfed

- › Y **ffactor pwysicaf** sy'n effeithio ar leithder gwasarn yw dyluniad a dulliau rheoli cafnau yfed
- › Rhaid i'r cafnau yfed fod ar yr uchder cywir ar gyfer yr adar

