



PROSIECT 
PORFA CYMRU

2021



FARMING
connect
cyswllt
FFERMIO
08456 000 813

CYFLWYNIAD

Mae Prosiect Porfa Cymru'n darparu gwybodaeth reolaidd ynglŷn â chyfraddau twf ac ansawdd porfa ar lefel ranbarthol i alluogi ffermwyr da byw i wneud penderfyniadau deallus a rhagweithiol yn ymwneud a rheoli'r borfa. Mae'r prosiect yn cynnwys 19 fferm laeth a 29 fferm bîff a/neu ddefaid sy'n mesur eu porfeydd ac yn darparu adborth am dueddiadau twf.

Gyda glawiad dibynadwy Cymru, y borfa yw ein "mantais fasnachol" yn y farchnad leol a byd-eang ar gyfer llaeth a chig coch. Dyma'r ffynhonnell fwyaf cynaliadwy o borthiant ar gyfer ein da byw ac, o'i rheoli'n dda, dyma'r ffynhonnell fwyaf proffidiol o lawer.

Nodau'r prosiect hwn yw:

- Casglu data dibynadwy i gynhyrchu cromliniau twf porfa ranbarthol i gynorthwyo cynlluniau rheoli pori ar y fferm
- Cofnodi cyfraddau twf porfeydd ranbarthol a'u rhannu gyda holl aelodau Cyswllt Ffermio
- Deall effaith y tywydd ar gynhyrchu porfa
- Deall effaith rheoli ar gynhyrchu porfa
- Cynorthwyo, rhannu a datblygu adnoddau ar gyfer gwneud penderfyniadau'n ymwneud â rheoli pori



DULL


Wedi'i lunio i ddarparu canlyniadau rheolaidd, dibynadwy a pherthnasol ar gyfer pob rhanbarth.

Ffermydd sy'n monitro

Rhannwyd Cymru yn wyth rhanbarth i ddarparu cynrychiolaeth gytbwys o'r math o bridd a'r dosbarth tir.

Dewiswyd o leiaf 2 ffermwr llaeth a 3 ffermwr bîff a/neu ddefaid o bob rhanbarth, gan gynrychioli'r mentrau da byw a'r mathau o dir pori nodweddiadol.

Mae'r map yn dangos y gwahanol ranbarthau o fewn y prosiect, gyda phob fferm fonitro wedi'i marcio ym mhob rhanbarth.



 = Ffermydd bîff a/neu ddefaid

 = Ffermydd llaeth

MESUR Y BORFA

Defnyddiodd pob ffermwr fesurydd plât codi a oedd yn cael ei raddnodi ac yn cynnwys plât plastig er mwyn sicrhau cysondeb.

Defnyddiwyd hafaliad safonol y diwydiant yn y DU ar gyfer deunydd sych, sef:

$$\text{Gorchudd (kgDM/ha)} = 125x + 640$$

(x = uchder tir pori cywasgedig mewn 0.5cm)



TECHNEG MESUR

Mesurwyd pob cae neu badog trwy osod y mesurydd o leiaf 30 gwaith ar bellter cyfartal ar draws y cae mewn siâp "W" neu ar letraws. Dilynodd y ffermwr yr un llwybr ar gyfer pob mesuriad.



AMLDER Y MESURIADAU

Bu ffermwyr llaeth yn mesur eu llwyfan bori bob wythnos. Bu ffermwyr bîff a/neu ddefaid yn mesur o leiaf 20 hectar (ha) fesul pythefnos.



COFNODI GORCHUDD

Bu'r ffermwyr yn cofnodi eu mesuriadau gorchudd glaswellt ar feddalwedd rheoli porfa Agrinet. Yna, buont yn cofnodi unrhyw achosion o bori neu silwair. Cofnodwyd nifer, pwysau a galw (am borfa) y da byw a oedd yn pori'r ardal. Cofnodwyd unrhyw dail neu wrtaith nitrogen a wasgarwyd.

FFERMWYR ARBENIGOL

Fel rhan o'r prosiect, mae pedwar rheolwr porfa arbenigol wedi bod yn rhoi cipolwg o'u systemau a'u prosesau gwneud penderfyniadau amserol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o ddeunyddiau o bodlediadau i fideos byr gan y ffermwyr arbenigol ar wefan Cyswllt Ffermio.



Ianto Parri
Gwynedd
Ffermwr bîff a
defaid



Rhys Williams
Gwynedd
Ffermwr llaeth



Bleddyn Davies
Ceredigion
Ffermwr defaid



Andrew Giles
Powys
Ffermwr llaeth

CROMLIN DWF


Mae'r graff isod yn dangos y cyfraddau twf glaswellt cyfartalog drwy gydol y flwyddyn ar ffermydd llaeth a bïff a/neu ddefaid.

Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn heriol o ran rheoli glaswellt. Cafwyd dechrau oer ac araf i'r tymor pori ym mis Ebrill a Mai, a arweiniodd at brinder bwyd ar amser allweddol o'r flwyddyn ar nifer o ffermydd. Dilynwyd hyn gan gynydd sylweddol mewn cyfraddau twf ym mis Mehefin, gyda llawer o ffermydd yn ei chael hi'n anodd cynnal ansawdd.

Mae glawiad lleol yn ystod misoedd yr haf wedi golygu bod cyfraddau twf glaswellt wedi amrywio'n sylweddol, gyda rhai ffermydd yn cario gwarged drwy'r haf ac eraill yn gorfod rhoi porthiant ychwanegol i'r stoc yn ystod y cyfnod sych.

Daeth diwedd yr haf â glawiad a thymheredd da i'r mwyafrif, gan ganiatáu i orchuddion porfa adeiladu a gosod ffermwyr mewn sefyllfa dda ar gyfer cyfnod pori yr Hydref.


Trwy fesur glaswellt yn rheolaidd a deall y galw ar ffermydd, gellir gwneud penderfyniadau rhagweithiol ynglŷn â rheoli'r borfa er mwyn sicrhau cyfaint ac ansawdd y glaswellt a dyfir ar y fferm, gan olygu felly bod stoc yn perfformio ar eu gorau gyda'r costau isaf posibl. Y twf cyfartalog yn ystod y prif dymor pori (Mai i Hydref) fu 58kgDM/ha/dydd ar gyfer llaeth a 36kgDM/ha/dydd ar gyfer bïff a/neu ddefaid.



TYFU PORFA

Mae'r graff isod yn dangos amcangyfrif o nifer y tunelli o ddeunydd sych (tDM/ha) a dyfwyd ar ffermydd llaeth, biff a/neu ddefaid ar draws yr wyth rhanbarth a fu'n rhan o Brosiect Porfa Cymru.

Rhwng 1 Mawrth a 30 Hydref. Yn ystod y cyfnod yma, fe dyfodd ffermydd llaeth gyfartaledd o 9t/DM/ha. Cyfartaledd ffermydd biff a defaid yn ystod y cyfnod oedd 7tDM/ha.



CANLYNIADAU

Cafodd y mesuriadau porfa eu lawr lwytho bob wythnos a'u gwirio i sicrhau cywirdeb, gan ddileu unrhyw anghysondebau.

Yna, cyfrifwyd cyfartaledd ar gyfer pob rhanbarth ac ar gyfer y wlad, wedi'u rhannu'n ffermydd biff a/neu ddefaid a ffermydd llaeth.

Rhoddwyd y wybodaeth ar fap a darparwyd nodiadau rheoli gan ymgynghorwyr pori ynghyd â ffermwyr profiadol o fewn y grŵp.

Cafodd y wybodaeth ei rhannu ar wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol Cyswllt Ffermio.

Sganiwch y cod i weld yr holl ganlyniadau







GRAFFIAU RHANBARTHOL



Mae'r graffiau'n dangos y cyfraddau twf glaswellt cyfartalog (kgDM/ha) ym mhob rhanbarth ar gyfer ffermydd llaeth a/neu ffermydd biff a defaid.



Ceir nifer o ffactorau sy'n effeithio ar gyfraddau twf glaswellt ar draws gwahanol ranbarthau gan gynnwys y tywydd a lleoliad y tir, math o bridd a ffrwythlondeb, penderfyniadau rheoli pori ac amrywiaeth glaswellt.

Trwy wybod y cyfraddau twf porfa wythnosol a'r duedd yn eich rhanbarth, gallwch wneud penderfyniadau rheoli pori rhagweithiol sy'n cynyddu cynhyrchiant ac yn lleihau costau.










ANSAWDD Y BORFA

Mae un fferm bîff a defaid ac un fferm laeth o bob rhanbarth (cyfanswm o 16) wedi bod yn casglu samplau o borfa ffres bob mis ar gyfer dadansoddiad NIR (Isgoch agos).

Mae hyn wedi darparu'r data canlynol:

- Egni (MJME)
- Protein (%)
- Deunydd Sych (%)

Mae'r graffiau isod yn dangos sut mae ansawdd y borfa wedi amrywio trwy gydol y flwyddyn ar ffermydd llaeth a bîff a/neu ddefaid. Ar y ffermydd a oedd yn samplu, nid yw'r samplau ansawdd tir pori cyfartalog wedi gostwng o dan 11 MEMJ neu 20% o brotein. Mae hyn wedi rhoi'r hyder i lawer o ffermwyr waredu'r angen i ddefnyddio dwysfwd, hyd yn oed ar adegau allweddol o gylchred cynhyrchu da byw.



Answdd porfa ar gyfartaledd ar gyfer bîff, defaid a llaeth.

	Egni MJME (%)	Protein (%)	Deunydd Sych (%)
Llaeth	12.0	22.9	18.8
Bîff a defaid	12.0	21.7	19.9

